

Параметры	Тип инциденталомы			
	Аденома коры	АКР	Феохромоцитома	Метастаз
Размер	Небольшой, обычно до 3 см	Большой, обычно более 4 см	Большой, обычно более 3 см	Вариабелен, чаще менее 3 см
Контур	Четкий, ровный	Неровный, бугристый	Круглый или овальный, четкий контур	Неровный, нечеткий контур
Структура	Гомогенная	Гетерогенная, с участками разной плотности	Гетерогенная, с жидкостными полостями	Гетерогенная, с участками разной плотности
Двустороннее поражение	+	+	+ - -	+ + -
Неконтрастная КТ-плотность	< или равно 10 ед. Hounsfield	>10 ед. Hounsfield (обычно >25)	> 10 ед. Hounsfield (обычно >25)	> 10 ед. Hounsfield (обычно >25)
Время полувыведения контраста при КТ	> или равно 50% через 10 мин	< 50% через 10 мин	< 50% через 10 мин	< 50% через 10 мин
Васкуляризация в контрастную фазу	-	+	+	+
МРТ-семиотика	Изоинтенсивны на T-2 взвешенных срезах относительно печени	Гиперинтенсивны на T-2 взвешенных срезах относительно печени	Наиболее гиперинтенсивны на T-2 взвешенных срезах относительно печени	Гиперинтенсивны на T-2 взвешенных срезах относительно печени
Некрозы, кровоизлияния, кальцинаты	-	+	+	+ -
Скорость роста	Медленная или отсутствует (< 1 см в год)	Обычно быстрая (> 2 см в год)	Обычно медленная (0,5 – 1 см в год)	Вариабельная, зависит от морф. типа